

Content Validity and Reliability of the Health Belief Model Questionnaire For Type II Diabetic Patients

Falahati Ebrahim¹, Abdi Alireza^{2*}, Salari Nader³, Ashtarian Hossien⁴

1. MSc student of nursing, students' research committee, nursing and midwifery school, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2. Assistant professor of nursing education, nursing department, nursing and midwifery school, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3. Assistant professor in biostatistics, nursing and midwifery school, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
4. Associate professor in health education and promotion, Research Center for Environmental Determinants of Health, health school, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

Article information:

Original Article

Received: 2023/08/5

Accepted: 2023/10/16

JDN 2023; 11(3)

2190-2202

Corresponding Author:
Alireza Abdi,
Kermanshah
University of Medical Sciences.

A_abdi61@yahoo.com

Abstract

Introduction: Data collection is a crucial step in any study, requiring access to a valid and reliable tool. The health belief model has long been utilized to promote preventive behaviors across various domains. Therefore, this study aims to develop a valid and reliable tool for assessing preventive behaviors in individuals with type II diabetes, based on the constructs of the health belief model.

Materials and Methods: This methodological study, conducted from 2017 to 2018, involved extracting instrument items from two sources: 1) a review of relevant texts and articles, and 2) an examination of existing questionnaires. The tool's psychometrics were evaluated using classical test theory. To establish the tool's validity, face and content validity were assessed, while Cronbach's alpha coefficient was employed to determine internal consistency. The findings were analyzed using SPSS 24 software.

Results: During the content validity stage, the average CVR and CVI were found to be 0.91 and 0.98, respectively. Cronbach's alpha coefficients for the constructs were as follows: perceived sensitivity 0.56, perceived intensity 0.83, perceived barriers 0.71, perceived benefits 0.86, self-efficacy 0.82, and cues to action 0.79. The overall internal consistency, measured by Cronbach's alpha, was 0.82.

Conclusion: This study's findings demonstrate that the preventive behaviors questionnaire, based on the health belief model's constructs, exhibits good validity and reliability for use in individuals with type II diabetes.

Keywords: Psychometrics, health belief model, type II diabetes

Access This Article Online

Quick Response Code:	Journal homepage: http://jdn.zbmu.ac.ir
	Falahati E, Abdi A, Salari N, Ashtarian H. Content Validity and Reliability of the Health Belief Model Questionnaire For Type II Diabetic Patients. J Diabetes Nurs 2023; 11 (3) :2190-2202



روایی محتوا و پایایی پرسشنامه مدل اعتقاد بهداشتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

ابراهیم فلاحتی^۱، علیرضا عبدی^{۲*}، نادر سالاری^۳، حسین اشتربیان^۴

۱. کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
۲. دانشیار آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
۳. دانشیار آمار زیستی، گروه پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
۴. دانشیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، گروه پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

A_abdi61@yahoo.com

نویسنده مسئول: علیرضا عبدی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

مقدمه و هدف: جمع‌آوری داده‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌های یک مطالعه، نیازمند دسترسی به ابزاری روا و پایا است، مدل اعتقاد بهداشتی دهه‌هاست که به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه در حوزه‌های مختلف به کار می‌رود. لذا مطالعه حاضر با هدف طراحی ابزاری معتبر و پایا به منظور بررسی رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو بر اساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی است.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه روش‌شناختی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ به طول انجامید. گویه‌های ابزار از دو منبع ۱) مرور متنون و مقالات مرتبط و ۲) بررسی پرسشنامه‌های موجود استخراج گردید. بر این اساس به منظور کسب اطمینان از روایی ابزار از روایی صوری و روایی محتوا و روایی محتوا و برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ جهت تعیین همسانی درونی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ استفاده شد.

یافته‌ها: در مرحله روایی محتوا، میانگین CVR و CVI به ترتیب، برابر با ۰/۹۱ و ۰/۹۸ بود. میزان آلفای کرونباخ برای سازه‌های، حساسیت درک شده ۰/۵۶، شدت درک شده ۰/۸۳، موانع درک شده ۰/۷۱، منافع درک شده ۰/۸۶، خودکارآمدی عمل ۰/۸۲ و راهنمایی عمل ۰/۷۹ به دست آمد. همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۰/۸۲ سنجیده شد.

نتیجه گیری: یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد، پرسشنامه رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می‌تواند به منظور سنجش و ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: روایی، پایایی، مدل اعتقاد بهداشتی، دیابت نوع دو.

How to site this article: Falahati E, Abdi A, Salari N, Ashtarian H. Content Validity and Reliability of the Health Belief Model Questionnaire For Type II Diabetic Patients. J Diabetes Nurs 2023; 11 (3):2190-2202



عادات جدید در جامعه استفاده می شود (۱۸). این مدل یکی از مدل های آموزشی است که رابطه بین اعتقادات بهداشتی و رفتار بهداشتی را نشان می دهد و تأکید فراوانی بر روی انگیزه افراد در انجام اعمال دارد، تفکر اولیه این مدل توسط هوچبام، کگل و روزن استاک در دهه ۱۹۵۰ ارائه شد، علت به کارگیری این مدل، عدم پذیرش مسائل بهداشتی توسط مردم و تبیین رفتار مردمانی بود که خود را از بیمار شدن مبرا می دانستند. بر اساس در این مدل برای تغییر رفتار، فرد باید احساس کند که در معرض خطر قرار دارد (حساسیت درک شده) و این خطر بسیار جدی است (شدت درک شده) و اتخاذ رفتارهای مثبت بهداشتی منافع زیادی برای وی دارد (منافع درک شده) و موانع موجود در جهت این تغییرات را می تواند مرتفع سازد (موانع درک شده) و عواملی انگیزه دهنده وجود دارند که باعث تشویق و تسهیل فرد بر اتخاذ این رفتارها می شوند (راهنمای عمل) و در نهایت اطمینان فرد به توانایی خود در پیگیری یک رفتار (خودکارآمدی) است (۱۹).

یکی از ویژگی های علم این است که با شواهد سروکار داریم و در نظام سلامت کارکردن با این شواهد به عنوان یک ارزش و التزام مطرح است. شواهد از طریق پژوهش ایجاد می شوند و زیربنای پژوهش سنجش است. پژوهش ابعاد متعددی دارد و فرآیند آن دارای گام های زیادی است؛ با این وجود ابزار سنجش از مهم ترین مشخصه های است که برای پژوهش متصور می شود. اگر قرار باشد پژوهش ما منجر به تولید شواهدی مفید شود باید سنجش ما، سنجش درستی باشد. نظر به اینکه کنترل دیابت نوع دو مستلزم رعایت رژیم غذایی، انجام فعالیت بدنی و مصرف دقیق داروها بوده و سهل انگاری در رعایت هر یک از این موارد منجر به پیشرفت بیماری و بروز عوارض برگشت ناپذیری خواهد شد (۲۰). مطالعه حاضر با تمرکز همزنان بر هر سه مورد فوق انجام شد. لذا برای ارزیابی اثربخشی آن نیاز به ابزاری دارد که تمامی موارد فوق را پوشش دهد و اما ابزارهای موجود بیش تر تمرکز بر یکی از جنبه های مراقبتی دیابت داشته و هیچ کدام به تنها یکی برای این مطالعه مناسب نخواهند بود (۲۱، ۲۰). بنابراین، مطالعه حاضر با هدف طراحی ابزاری معتبر و پایا به منظور بررسی

مقدمه و هدف

دیابت، بیماری مزمن و ناتوان کننده ای است (۱) که مشخصه اصلی آن گلوکز خون بالا است (۲). دیابت نوع دو یکی از شایعترین بیماری های غدد درون ریز است (۳). تقریباً ۹۰ درصد از کل موارد دیابت در سرتاسر جهان را شامل می شود (۴) و به عنوان عامل خطر اصلی قابل پیشگیری برای پیشرفت بیماری های قلبی عروقی و مرگ و میر ناشی از آن ها در سرتاسر جهان در نظر گرفته می شود (۵). تا جایی که از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان هفتمین علت مرگ و میر، اولین علت کوری (۶) و قطع عضو (۷)، و نارسایی کلیه در بسیاری از جوامع شناخته شده است (۸). بر اساس گزارش فدراسیون بین المللی دیابت، در سال ۲۰۱۹ در جهان ۴۶۳ میلیون نفر به دیابت مبتلا بودند و پیش بینی می شود این آمار در سال ۲۰۴۵ بالغ بر ۷۰۰ میلیون نفر باشد (۹). در ایران، فراوانی این بیماری ۳/۵ میلیون نفر گزارش شده است (۱۰). تخمین زده می شود در سال ۲۰۳۰، ۹/۲ میلیون ایرانی تحت تأثیر این بیماری قرار گیرند (۱۱).

با توجه به عوارض طولانی مدت دیابت نوع دو و هزینه های اقتصادی -اجتماعی آن، انجام اقدامات لازم برای کاهش عوارض و کنترل بیماری در افراد مبتلا ضروری می باشد (۱۲). در این راستا باید عنوان داشت، کنترل دیابت نوع دو برنامه مراقبتی خاص خود را دارد و مستلزم شرکت کنش ۶-مnd بیماران در انجام رفتارهای پاییندی به درمان از جمله ورزش، تغذیه، کنترل قند خون، وارسی پاهای و تعییت از دستورالعمل های پژوهشی است (۱۳-۱۵). از این رو بیش از ۹۵ درصد فرآیند مراقبت و درمان توسط خود افراد مبتلا به دیابت نوع دو تحت عنوان خودمراقبتی انجام می شود و تیم درمان کنترل کمی بر بیماری دارد (۱۶). به طوری که بررسی ابروگل و همکاران (۲۰۲۱) حاکی از این است که پیروی از رفتارهای خودمراقبتی در مبتلایان به دیابت که آموزش خودمراقبتی دریافت کرده بودند نسبت به کسانی که تنها مراقبت های روتین را دریافت کرده بیشتر است (۱۷).

مدل اعتقاد بهداشتی مدلی است که معمولاً در تحقیقات برای مطالعه و تشخیص رفتارهای آموخته شده و ایجاد



پرستاری و آموزش بهداشت به صورت چهره به چهره مصاحبه شد و از آن‌ها خواسته شد تا گوییه‌ها را بر اساس سطح دشواری، میزان تناسب و ابهام بررسی کنند نظراتشان یادداشت شد و اصلاحات مورد نیاز بر اساس نظرات پاسخ‌دهندگان انجام شد.

روایی محتوا

یکی از مهم‌ترین بخش‌های ارزیابی روایی یک ابزار، بررسی روایی محتوا است. منظور از روایی محتوا این است که آیا محتوای پرسشنامه مناسب و مرتبط با اهداف مطالعه است و آیا قابلیت اندازه‌گیری هدف تعیین شده را دارد یا خیر (۲۸)؟ به عبارت دیگر هدف از روایی محتوا کسب اطمینان از توانایی ابزاری برای سنجش پدیده (یا مفهومی) است که ادعای سنجش آن را دارد (۲۹). در این مطالعه برای بررسی روایی محتوا، از دو شاخص نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد.

به منظور محاسبه CVR، از ده نفر از متخصصان پرستاری، آموزش بهداشت و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت درخواست گردید تا ضرورت تک تک گوییه‌ها را بر اساس طیف لیکرت سه قسمتی شامل «ضروری است»، «مفید است ولی ضروری نیست» و «ضرورتی ندارد» تعیین کنند. سپس به منظور محاسبه CVR از فرمول زیر استفاده شد (۳۰):

$$CVR = (Ne - N/2)/(N/2)$$

در این فرمول Ne تعداد متخصصانی است که گزینه «ضروری است» را انتخاب کرده‌اند و N تعداد کل متخصصان می‌باشد. بدین منظور پرسشنامه اولیه در اختیار ۱۰ نفر از متخصصان مجرب در سه حیطه آموزش بهداشت، ارتقاء سلامت و پرستاری قرار داده شد و پیشنهادات و نظرات اصلاحی آن‌ها جمع آوری گردید. حداقل مقدار قابل قبول برای CVR به کمک جدول لاوشه و بر مبنای تعداد متخصصان ارزیاب، تعیین می‌گردد. طبق جدول لاوشه حداقل عددی که گوییه باید کسب کند تا در پرسشنامه باقی بماند، بر اساس ده متخصص ۰/۶۲ است (۳۱). در این مرحله ۲۷ گوییه حذف شدند و ۴۹ گوییه باقی ماند.

CVI، میزان مرتبط بودن هر یک از گوییه‌های ابزار را تعیین می‌کند، تعیین اینکه آیا گوییه‌های ابزار به بهترین نحو جهت اندازه‌گیری محتوا طراحی شده‌اند (۳۲). ابتدا

رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو بر اساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی است.

روش پژوهش

مطالعه حاضر، یک مطالعه روش شناختی است که با هدف تعیین روایی و پایایی پرسشنامه‌ای به منظور بررسی رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو بر اساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در دو مرحله انجام شد.

الف) تدوین گوییه‌ها و طراحی ابزار

اولین گام طراحی ابزار، تعیین دقیق مفهوم و سازه مورد اندازه‌گیری است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به دنبال اندازه‌گیری چه چیزی است. بنابراین، هرچقدر مفهوم مورد نظر شفاف تر تعریف شده باشد؛ گوییه‌های طراحی شده به خوبی معرف سازه مورد نظر و ابعاد آن بوده و به شکل مناسب تری آن مفهوم را اندازه‌گیری می‌کنند (۲۲، ۲۳). پس از مفهوم سازی و تبیین ابعاد پرسشنامه بر اساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی، پیشنهاد گوییه‌های متناظر با هر حیطه توسط تیم پژوهش انجام و استخر گوییه‌ها تشکیل شد و مقیاس اندازه‌گیری مناسب با هر گوییه پیشنهاد شد. سپس مرور متون جهت تدوین گوییه‌های پرسشنامه در مقالات و ابزارهای موجود انجام شد (۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۵). مجموع گوییه‌ها در این مرحله ۱۷۹ مورد بود. پس از تشکیل استخر گوییه‌ها، کلیه گوییه‌ها توسط گروه تحقیق مورد بررسی و بازنگری قرار گرفتند، گوییه‌های هم پوشان و اضافی، با هم ادغام یا حذف شدند. و در نهایت پرسشنامه اولیه با ۷۶ گوییه با مقیاس لیکرتی ۵ تایی آماده شد تا وارد مرحله روان سنجی شود.

ب) روان سنجی ابزار

در این مرحله، روان سنجی ابزار بر اساس نظریه آزمون کلاسیک انجام شد (۲۶). بر این اساس به منظور کسب اطمینان از روایی ابزار از روایی صوری و روایی محتوا و برای پایایی ابزار از ضربی آلفای کرونباخ جهت تعیین همسانی درونی استفاده شد (۲۷).

روایی صوری

برای تعیین روایی صوری از روش کیفی استفاده شد. ابتدا با ۵ نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع دو و ۵ نفر از اساتید



ابزار) بازنگری، ویرایش و قابل فهمتر شدن. در مرحله روایی محتوا، میانگین CVR برابر با ۰/۹۱ بود و ۲۷ گویه (طبق جدول لاوشہ برای ۱۰ متخصص)، با CVR کمتر از ۰/۶۲ حذف شدند. میانگین CVI برابر با ۰/۹۸ بود. در نهایت پس از جمع بندی نظرات خبرگان، ۴۹ گویه، با در نظر گرفتن طیف لیکرت ۵ تایی از کاملا مخالف تا کاملا موافق در ابزار باقی ماند و گزینه خنثی (نظری ندارم) گزینه قابل اندازه گیری شد (با حداقل امتیاز ۲۴۵ و حداقل امتیاز ۴۹).

جهت تعیین پایایی پرسشنامه، پس از بررسی روایی صوری و روایی محتوایی پرسشنامه، همسانی درونی پرسشنامه طراحی شده به صورت پایلوت در نمونه‌ای شامل ۳۱ نفر از افراد مبتلا به دیابت نوع دو تعیین شد که ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۰/۸۲ بود (جدول ۱)، که مطابق فرمول پیشنهادی سیم و رایت نمره قابل قبول کسب نموده است (۳۶). تنها سازه‌ای که در این پرسشنامه کمتر از ۰/۷۰ برخوردار است سازه حساسیت درک شده است که در زمان تحلیل و آنالیز باید مورد دقت قرار گیرد.

جدول شماره ۱: نتایج آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی

آلفای کرونباخ	تعداد سوالات	سازه‌ها
۰/۵۶	۵	حساسیت درک شده
۰/۸۳	۷	شدت درک شده
۰/۸۶	۷	منافع درک شده
۰/۷۱	۱۰	موانع درک شده
۰/۸۲	۱۱	خودکارآمدی
۰/۷۹	۹	راهنما برای عمل
۰/۸۲	۴۹	جمع

در نهایت پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بررسی رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو، ۴۹ گویه با پایایی ۰/۸۲ با شش سازه حساسیت درک شده (شامل ۵ گویه)، شدت درک شده (شامل ۷ گویه)، منافع درک شده (شامل ۷ گویه)، موانع درک شده (شامل ۱۰ گویه)،

CVI مربوط به هر گویه مطابق با فرمول پیشنهای والتر و باسل محاسبه گردید. در این راستا، از ۵۰ متخصص دیگر خواسته شد هر یک از گویه‌های ابزار را از نظر معیار مرتبط بودن، ساده بودن و واضح بودن به صورت مجزا بر اساس طیف لیکرتی چهار قسمتی بررسی کنند

$$CVI = \frac{\text{Number of raters giving a rating of 3 or 4}}{\text{total number of raters}}$$

بنابراین در این مطالعه درصد نمرات حاصل از شاخص روایی محتوى والتس و باسل برای هر عبارت با استفاده از فرمول فوق محاسبه و گویه‌هایی که نمره ۰/۷۹ و بیش تر کسب کردند مناسب تشخیص داده شدند (۳۳). در پایان این مرحله ۴۹ گویه باقی مانده تأیید و وارد مرحله پایایی شد.

پایایی، به تکرارپذیری یا استحکام نمره‌ها از یک ارزیابی به ارزیابی دیگر اشاره می‌کند. ابزار پایا نشان می‌دهد که در تکرار استفاده از ابزار، نمرات تحت تأثیر خطای تصادفی قرار نمی‌گیرند (۳۴). در این مطالعه از همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای تعیین پایایی ابزار استفاده شد. آلفای کرونباخ را می‌توان پرکاربردترین شیوه به منظور تعیین همسانی درونی دانست؛ اجرای یکباره آزمون در این روش اثرات فاصله زمانی از قبیل حافظه و تمرین را به حداقل می‌رسد. معمولاً مقدار آلفای ۰/۷۰ یا بالاتر به عنوان پایایی قابل قبول ابزار در نظر گرفته می‌شود (۳۵). برای ارزیابی همسانی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد به طوری که پرسشنامه توسط ۳۱ بیمار مبتلا به دیابت نوع دو پر شد، سپس جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ استفاده شد.

یافته‌ها

برای طراحی پرسشنامه، گویه‌ها از دو منبع (۱) مروج متون و مقالات مرتبط (۲) بررسی پرسشنامه‌های موجود استخراج شد. به این ترتیب مهم ترین و مرتبط ترین گویه‌ها شامل ۹۷ گویه، استخر گویه‌ها را تشکیل دادند. پس از دو جلسه تیم پژوهشی و متخصصان، با انتخاب بهترین گویه‌های مرتبط، تعداد گویه‌ها به ۷۶ مورد کاهش یافت و سپس فرآیند روان سنجی انجام شدند.

در مرحله ارزیابی روایی صوری ابزار، بسیاری از موارد بر اساس دیدگاه افراد مبتلا به دیابت نوع دو (گروه هدف اصلی



توجه به همسانی درونی بالای پرسشنامه بررسی رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو، امکان تقلیل گویه‌های پرسشنامه جهت سهولت بیشتر کاربرد پرسشنامه در مطالعات آنی وجود دارد (۴۷). از محدودیت‌های این مطالعه و دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه، می‌توان به عدم انجام تحلیل عاملی اکتشافی اشاره کرد که شاید به مشخص بودن سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی برگردد (۴۰-۴۲). پیشنهاد می‌شود پژوهشگران در مطالعه‌های آنی به اجرای تحلیل عاملی تاییدی بپردازنند.

نتیجه‌گیری

پرسشنامه حاضر، یک ابزار روا و پایا جهت ارزیابی رفتارهای پیشگیرانه در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو است. این پرسشنامه برای دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی پرستاری و سایر حرف بهداشتی قابل استفاده است. همچنین می‌تواند توسط پرسنل پرستاری و مراقبین بهداشتی، جهت بررسی و ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو استفاده شود.

ملاحظات اخلاقی

این پژوهش با کد IR.KUMS.REC.1396.387 در مورخه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تایید شد. کلیه شرکت کنندگان در جریان هدف مطالعه قرار گرفتند و رضایت نامه کتبی و آگاهانه از هر یک از آنها اخذ گردید.

تشکر و قدردانی

این مطالعه برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه (کد طرح: ۹۶۵۳۹) است. پژوهشگران به این وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی افرادی که در انجام این پژوهش مساعدت کرده اند به ویژه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ابراز می‌دارند.

گویه)، راهنمای عمل (شامل ۹ گویه)، و خودکارآمدی (شامل ۱۱ گویه) به دست آمد. (جدول شماره ۲)

بحث و نتیجه‌گیری

پرسشنامه بررسی رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو با ۴۹ گویه بر اساس شش سازه مدل اعتقاد بهداشتی طراحی شد. در این مطالعه، روابی صوری، روابی محتوایی همسانی درونی پرسشنامه بررسی و تایید شد. مدل اعتقاد بهداشتی که در این مطالعه به عنوان چهارچوب اصلی پژوهش بکارگرفته شد، در مطالعات مختلف جهت طراحی و ارزیابی مداخلات ارتقاء رفتارهای بهداشتی، مورد استفاده قرار گرفته است (۳۷). در مطالعه گودرزی و همکاران روابی توسط ۶ نفر از متخصصین انجام شد و آلفای کرونباخ برابر با ۰/۷۵ بود (۳۸) با این حال بررسی روابی محتوا پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه با تنوع متخصصین بیشتر، توسط ۱۰ نفر از اساتید پرستاری و دیگر متخصصین حوزه سلامت انجام شد.

در این مطالعه تنها سازه‌ای که آلفای کرونباخ کمتر ۰/۷۰ دارد، سازه حساسیت درک شده است. در مطالعه زینت مطلق و همکاران (۳۹) ضریب آلفای کرونباخ سازه حساسیت درک شده ۰/۶۶، و همچنین در مطالعه صفاجو و همکاران (۴۰) ضریب آلفای کرونباخ سازه حساسیت درک شده ۰/۶۸ می‌باشد. ضریب پایین این سازه شاید به انتزاعی بودن آن برگردد؛ بنابراین باید در زمان تحلیل و آنالیز نتایج مورد دقت قرار گیرد. در این مطالعه همچون مطالعه شکوهی و همکاران (۴۱)، صفاجو و همکاران (۴۰) و فانی و همکاران (۴۲) برای بررسی پایایی از همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) استفاده شد؛ اما در مطالعه صادقی و همکاران (۴۳) از ثبات (آزمون-بازآزمون) استفاده شده است.

پایایی و قابل اعتماد بودن نمرات بدست آمده از یک ابزار، همواره یکی از مهم ترین ویژگی‌های است که کاربرد مطمئن ابزار را در محیط بالینی و پژوهشی امکان‌پذیر می‌کند. در این راستا ضریب آلفای کرونباخ شناخته شده ترین آماره‌ای است که برای اندازه‌گیری همسانی درونی استفاده می‌شود (۴۵، ۴۶). در مطالعه حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۰/۸۲ محاسبه گردید که این نتایج با یافته‌های پورغلامی و همکاران، همخوانی دارد (۴۶). با



جدول شماره ۱: گویه‌های پرسشنامه بررسی رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو**گویه‌های پرسشنامه بررسی رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو****سازه حساسیت درک شده**

- ۱) من از ابتلا به عوارض دیابت نگران هستم.
- ۲) این احتمال وجود دارد که من در آینده به عوارض دیابت مبتلا شوم.
- ۳) به دلیل بهبودی سریع زخم هایم احتمال ابتلا به عوارض دیابت در من بسیار کم است.
- ۴) تا زمانی که احساس می‌کنم خوب هستم، دچار عوارض دیابت نمی‌شوم.
- ۵) من هنوز مبتلا به عوارض دیابت نشده ام، بنابراین نیازی به کنترل قند خون ندارم.

سازه شدت درک شده

- ۶) دیابت یک بیماری خطیرناک است.
- ۷) در صورت ابتلا به عوارض دیابت آرامش روحی و روانی من دچار اختلال می‌شود.
- ۸) در صورت ابتلا به عوارض دیابت از نظر کاری و مسئولیت‌های خانوادگی با مشکل مواجه می‌شوم.
- ۹) ابتلا به عوارض دیابت باعث اختلال در روابط اجتماعی من می‌شود.
- ۱۰) ابتلا به عوارض دیابت باعث وابسته شدن من به دیگران می‌شود.
- ۱۱) ابتلا به عوارض دیابت باعث تحمیل هزینه‌های اقتصادی فراوان به من می‌شود.
- ۱۲) ابتلا به عوارض دیابت می‌تواند با تکرار بستری شدن در بیمارستان همراه باشد.

سازه موانع درک شده

- ۱۳) به نظر من عوارض دیابت قابل کنترل نیست.
- ۱۴) رعایت رژیم غذایی صحیح بیماران دیابتی برای من پرهزینه است.
- ۱۵) رعایت رژیم غذایی مخصوص افراد دیابتی برای من آزار دهنده است (باب میل من نیست).
- ۱۶) بخاطر علاقه زیاد به مصرف غذاهای شیرین و قندی نمی‌توانم رژیم غذایی توصیه شده در بیماران دیابتی را رعایت کنم.
- ۱۷) من نیازی به خرید دستگاه کنترل قند ندارم، زیرا به طور منظم به دیدن دکتر می‌روم.
- ۱۸) انجام فعالیت بدنی منظم برای من وقت‌گیر است.
- ۱۹) من هزینه خرید دستگاه اندازه گیری قند خون را ندارم.
- ۲۰) من حوصله انجام ورزش را ندارم.
- ۲۱) من نمی‌دانم چگونه از ابتلای به دیابت پیشگیری کنم.
- ۲۲) رعایت رژیم غذایی در مهمنانی‌ها و تفریحات دشوار است.

سازه منافع درک شده

- ۲۳) ورزش منظم (پیاده روی) در کنترل عوارض دیابت موثر است.
- ۲۴) با رعایت رژیم غذایی مناسب بیماران دیابتی، باعث پیشگیری از عوارض در بیماران دیابتی می‌شوم.
- ۲۵) حفظ قند خون در حد نرمال به پیشگیری از عوارض دیابت کمک می‌کند.
- ۲۶) مراقبت و شستشوی روزانه پاهای در پیشگیری از زخم پای دیابتی موثر است.
- ۲۷) مصرف سبزیجات و میوه‌های غیر شیرین در کنترل عوارض دیابت موثر است.
- ۲۸) به نظرم اگر داروهایم را درست مصرف کنم سطح قند خونم بهتر کنترل می‌شود.
- ۲۹) به نظرم اگر قند خونم طبیعی شود احتمال ابتلا به عوارض دیابت در من کمتر می‌شود.



سازه خودکارآمدی

- ۱) تا چه حد به توانایی خود جهت رعایت رژیم غذایی توصیه شده برای بیماران دیابتی اطمینان دارید؟
- ۲) من مطمئن هستم حتی در زمان هایی که وقت کافی نداشته باشم، برنامه منظم ورزشی خود را رعایت می کنم. (سه بار در هفته)
- ۳) من مطمئن هستم حتی در زمان هایی که از سوی اطرافیانم مورد حمایت قرار نگیرم، رژیم غذایی توصیه شده را رعایت می کنم.
- ۴) من مطمئن هستم حتی در مراسمات و مهمانی ها، رژیم غذایی توصیه شده را رعایت می کنم.
- ۵) من مطمئن هستم حتی در صورتی که برایم مشکل و دشوار باشد، رژیم غذایی توصیه شده را رعایت می کنم.
- ۶) من اطمینان دارم می توانم هر سه ماه یکبار جهت کنترل قند خون به پزشک متخصص مراجعه کنم.
- ۷) من اطمینان دارم می توانم داروهای تجویز شده دیابت را درست مصرف نمایم.
- ۸) من اطمینان دارم می توانم با دستگاه اندازه گیری قند خون، قند خونم را در منزل اندازه بگیرم.
- ۹) من اطمینان دارم می توانم تحت هر شرایطی داروهای تجویز شده را دقیق و به موقع مصرف نمایم.
- ۱۰) من اطمینان دارم می توانم حتی در صورت عدم نظارت دیگران داروهایم را درست مصرف کنم.
- ۱۱) من اطمینان دارم می توانم در منزل وزنم را بطور روزانه با ترازو اندازه بگیرم.

سازه راهنمای عمل

- ۱۲) پرهیز از پرخوری و مصرف مواد غذایی شیرین، باعث کاهش استرس در من می شود.
- ۱۳) پرخوری من را در خصوص مراقبت از خودم در برابر بیماری دیابت به فکر می برد.
- ۱۴) رعایت رژیم غذایی مناسب باعث احساس سلامتی در من می شود.
- ۱۵) ورزش منظم باعث احساس نشاط در من می شود.
- ۱۶) بالا یا پایین رفتن قند خونم من را در خصوص مراقبت از خودم در برابر بیماری دیابت به فکر می برد.
- ۱۷) زخم هایی که در پاهایا یا سایر قسمت های بدنم ایجاد می شوند، من را در خصوص مراقبت از خودم به فکر می برد.
- ۱۸) توصیه های پزشک و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی، مشوق خوبی برای من در پیروی از دستورات درمانی هستند.
- ۱۹) برنامه های رادیو و تلویزیون، رعایت رژیم غذایی مناسب برای بیماران دیابتی را به من توصیه می کنند.
- ۲۰) سایر بیماران دیابتی، رعایت رژیم غذایی مناسب برای بیماران دیابتی را به من توصیه می کنند.



References

1. Elnaggar A, Ta Park V, Lee SJ, Bender M, Siegmund LA, Park LG. Patients' Use of Social Media for Diabetes Self-Care: Systematic Review. Journal of medical Internet research. 2020;22(4):e14209.
2. Cherney DZI, Charbonnel B, Cosentino F, Dagogo-Jack S, McGuire DK, Pratley R, et al. Effects of ertugliflozin on kidney composite outcomes, renal function and albuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus: an analysis from the randomised VERTIS CV trial. Diabetologia. 2021;64(6):1256-67.
3. Mannucci E, Targher G, Nreu B, Pintaudi B, Candido R, Giaccari A, et al. Effects of insulin on cardiovascular events and all-cause mortality in patients with type 2 diabetes: A meta-analysis of randomized controlled trials. 2022;32(6):1353-60.
4. Rajlic S, Treede H, Münzel T, Daiber A, Duerr GD. Early Detection Is the Best Prevention-Characterization of Oxidative Stress in Diabetes Mellitus and Its Consequences on the Cardiovascular System. Cells. 2023;12(4).
5. Carter N, Chahal P, Chattopadhyay K. Effectiveness and safety of self-management interventions among adult type 2 diabetes mellitus patients in sub-Saharan Africa: a systematic review protocol. JBI evidence synthesis. 2022;20(1):204-13.
6. Wykoff CC, Khurana RN, Nguyen QD, Kelly SP, Lum F, Hall R, et al. Risk of Blindness Among Patients With Diabetes and Newly Diagnosed Diabetic Retinopathy. Diabetes Care. 2021;44(3):748-56.
7. Lopez-de-Andres A, Jimenez-Garcia R, Hernandez-Barrera V, de Miguel-Diez J, de Miguel-Yanes JM, Omaña-Palanco R, et al. Trends of Non-Traumatic Lower-Extremity Amputation and Type 2 Diabetes: Spain, 2001-2019. Journal of Clinical Medicine. 2022;11(5).
8. Filippatos G, Anker SD, Agarwal R, Pitt B, Ruilope LM, Rossing P, et al. Finerenone and cardiovascular outcomes in patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes. 2021;143(6):540-52.
9. Klaprat N, Benjamin C, Brandt J, Gregoire N, Merrill K, Mackay D, et al. Restructuring Clinical Trials in Type 1 Diabetes and Exercise in the Context of Adult Patient-Oriented Research: An Intervention Codevelopment Protocol. Canadian Journal of Diabetes. 2020;44(8):734-9.
10. Jani H, Khazaie T, Yaghoubi G, Sharifzadeh G, Akbari AJohric. Effect of multimedia education on eye care performance and perception of the disease in type 2 diabetic patients referred to Birjand Diabetic Clinic. 2020;5(4):57-67.
11. Farhadnejad H, Teymoori F, Asghari G, Mokhtari E, Mirmiran P, Azizi F. The higher adherence to a healthy lifestyle score is associated with a decreased risk of type 2 diabetes in Iranian adults. BMC Endocrine Disorders. 2022;22(1):42.



- 12.** Rangel É B, Rodrigues CO, de Sá JR. Micro- and Macrovascular Complications in Diabetes Mellitus: Preclinical and Clinical Studies. *Journal of Diabetes Research.* 2019;2019:2161085.
- 13.** Leon N, Namadingo H, Bobrow K, Cooper S, Crampin A, Pauly B, et al. Intervention development of a brief messaging intervention for a randomised controlled trial to improve diabetes treatment adherence in sub-Saharan Africa. *BMC Public Health.* 2021;21(1):147.
- 14.** Hildebrand JA, Billimek J, Lee JA, Sorkin DH, Olshansky EF, Clancy SL, et al. Effect of diabetes self-management education on glycemic control in Latino adults with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *Patient education and counseling.* 2020;103(2):266-75.
- 15.** Legaard GE, Feineis CS, Johansen MY, Hansen KB, Vaag AA, Larsen EL, et al. Effects of an exercise-based lifestyle intervention on systemic markers of oxidative stress and advanced glycation endproducts in persons with type 2 diabetes: Secondary analysis of a randomised clinical trial. *Free radical biology & medicine.* 2022;188:328-36.
- 16.** Mattsson K, Nilsson-Condori E, Elmerstig E, Vassard D, Schmidt L, Ziebe S, et al. Fertility outcomes in women with pre-existing type 2 diabetes-a prospective cohort study. *Fertility and sterility.* 2021;116(2):505-13.
- 17.** Eroglu N, Sabuncu N. The effect of education given to type 2 diabetic individuals on diabetes self-management and self-efficacy: Randomized controlled trial. *Primary Care Diabetes.* 2021;15(3):451-8.
- 18.** Vahedian-Shahroodi M, Tehrani H, Robat-Sarpooshi D, GHolian-Aval M, Jafari A, Alizadeh-Siuki HJIJoHP, et al. The impact of health education on nutritional behaviors in female students: An application of health belief model. *International Journal Of Health Promotion and Education.* 2021;59(2):1-13.
- 19.** Sharma M. Theoretical foundations of health education and health promotion: Jones & Bartlett Learning; 2021.
- 20.** Farahani Dastjani F, Shamsi M, Khorsandi M, Ranjbaran M, Rezvanfar M. Evaluation of the effects of education based on health belief model on medication adherence in diabetic patients. *Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism.* 2016;18(2):143-50.
- 21.** Zinat Motlagh F, Sharifirad G, Jalilian F, Mirzaei Alavijeh M, Aghaei A, Ahmadi-Jouibari T. Effectiveness of educational programs to promote nutritional knowledge in type II diabetes patients based on health belief model. *Health System Research.* 2013;9(4):412-20.
- 22.** Cope DG. Methods and meanings: credibility and trustworthiness of qualitative



- research. *Oncol Nurs Forum*; 2014;1(41):89-91.
- 23.** Carpenter S. Ten steps in scale development and reporting: A guide for researchers. *Communication Methods and Measures*. 2018;12(1):25-44.
- 24.** Zareban I, Niknami S, Hidarnia A, Rakhshani F. Predictors of self-care behavior and its effective factors among women's with type 2 diabetes patients in Zahedan via Health Belief model. *Journal of Health System Research*. 2014;1797-805.
- 25.** Vazini H, Barati M. Predicting factors related to self-care behaviors among type 2 diabetic patients based on health belief model. *Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences*. 2014;1(4):16-25.
- 26.** Avila ML, Stinson J, Kiss A, Brandão LR, Uleryk E, Feldman BM. A critical review of scoring options for clinical measurement tools. *BMC Research Notes*. 2015;8(1):1-11.
- 27.** Polit DF, Yang F. Measurement and the measurement of change: a primer for the health professions: Wolters Kluwer Philadelphia; 2016.
- 28.** Esmaeili N, Tarighat Esfanjani A, Gholipour K. Designing and determining validity and reliability of a questionnaire to identify factors affecting nutritional behavior among patients with metabolic syndrome. *Yafte*. 2017;19(1):77-86.
- 29.** Taghizade Z, Ebadi A, Montazeri A, Shahvari Z, Tavousi M, Bagherzadeh R. Psychometric Properties of health related measures. Part 1: transliation, development, and content and face Validity. *Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research (PAYESH)* 2017;16(3):343-57.
- 30.** Grove SK, Burns N, Gray J. The practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence. 7th Edition ed: Elsevier Health Sciences; 2013.
- 31.** Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology*. 1975;28(4):563-75.
- 32.** Polit D, Beck C. Study guide for essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice: Lippincott Williams & Wilkins; 2020.
- 33.** Polit DF, Beck CT. The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. *Research in Nursing & Health*. 2006;29(5):489-97.
- 34.** Ebadi A, Zarshenas L, Rakhshan M, Zareiyan A, Sharifnia S, Mojahedi M. Principles of scale development in health science. Tehran: Jame-e-negar. 2017:P.177.
- 35.** Taber KS. The use of Cronbach's alpha when developing and reporting research instruments in science education. *Research in science education*. 2018;48(6):1273-96.



- 36.** Sim J, Wright C. Research in health care: concepts, designs and methods: Nelson Thornes; 2000.
- 37.** Chatripour R, Shojaeizadeh D, Tol A, Sayehmiri K. Determining Health Belief Model Constructs to Prevent Cardiovascular Diseases among Teachers of Boys high Schools in Dehloran City. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2017;25(2):35-41.
- 38.** Goodarzi M, Sarmadi M, Saeid N. Effect of Distance Education via Short Message Service of Mobile Phones on Self-efficacy and HbA1C of Patients with type 2 Diabetes Mellitus. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal (PCNM). 2015;4(2):1-13.
- 39.** Zinat Motlagh F, Sharifirad G, Jalilian F, Mirzaei Alavijeh M, Aghaei A, T. A-J. Effectiveness of educational programs to promote nutritional knowledge in type II diabetes patients based on health belief model. HSR.2013;9(4):412-20.
- 40.** Safajou S, Rezaeian M, Salim Abadi Y, Mazar L, Nasirzadeh MJJoRUoMS. The Effect of Educational Intervention on the Preventive Behaviors of Diabetes Based on the Health Belief Model among At-Risk Male Students in the Second Grade of Khash High School in 2019: A Quasi-Experimental Study. Journal of Rafsanjan University of Medical Science. 2022;21(5):515-32.
- 41.** Shokouhi F, Amiripour A, Rabiei LJSJoN, Midwifery, Faculty P. Application of Health Belief Model on Nutritional Behavior Change in Women with Type 2 Diabetes in Shahrekord. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2021;7(2):47-59.
- 42.** Fani N, Mohebbi B, Sadeghi R, Tol A, Shamshiri AJIJoD, Metabolism. Assessing the effect of educational intervention on promoting nutrition adherence among patients with type 2 diabetes referee to South Health Center of Tehran University of Medical Sciences: Application of Health belief model. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2018;17(1):13-22.
- 43.** Sadeghi R, Rezaeian M, Khanjani N, Iranpour A. The applied of health belief model in knowledge, attitude and practice in people referred for diabetes screening program: an educational trial. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences.2015;13(11):1061-72.
- 44.** Scarpa A, Reyes NM, Patriquin MA, Lorenzi J, Hassenfeldt TA, Desai VJ, et al. The modified checklist for autism in toddlers: Reliability in a diverse rural American sample. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2013;43(10):2269-79.
- 45.** Inada N, Koyama T, Inokuchi E, Kuroda M, Kamio Y. Reliability and validity of the Japanese version of the Modified Checklist for autism in toddlers (M-CHAT). Research in Autism



Spectrum Disorders. 2011;5(1):330-6.

46. Porgholmi M, Farmanbar R, Kasmaei P, Omidi S. The Effect of Training Program Based on Health Belief Model Developed by the Fear of Self-Care Behavior and Hba1c Levels in Patients with Type 2 Diabetes. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;5(1):65-72.

47. Heravi M, Hatami M, Ahadi HJIJoA. Designing a Happiness Questionnaire for the Elderly in Iran and Determining Its Psychometric Properties. Iranian Journal of Ageing. 2020;15(3):380-95.

